【SR-5　評価シート　介入研究　記入例】

診療ガイドライン	虚血性脳卒中に対するアルテプラーゼ
対象	虚血性脳卒中（79 歳までの成人）
介入	6 時間以内のアルテプラーゼ 0.6mg/kg 静注
対照	プラセボ

＊各項目の評価は「高（−2)」,「中／疑い（−1)」,「低（0)」の 3 段階。
まとめは「高（−2)」,「中（−1)」,「低（0)」の 3 段階でエビデンス総体に反映させる。

アウトカムごとに別紙にまとめる。

アウトカム	発症 6 ヵ月後の総死亡

個別研究		バイアスリスク*										非直接性*					リスク人数（アウトカム率）								
		選択バイアス		実行バイアス	検出バイアス	症例減少バイアス		その他																	
研究コード	研究デザイン	ランダム化	コンシールメント	盲検化	盲検化	ITT	アウトカム不完全報告	選択的アウトカム報告	早期試験中止	その他のバイアス	まとめ	対象	介入	対照	アウトカム	まとめ	対照群分母	対照群分子	(%)	介入群分母	介入群分子	(%)	効果指標（種類）	効果指標（値）	信頼区間
IST-3	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	0	0	−1	1520	407	26.8	1515	408	26.9	RR	1.006	0.89 − 1.13
EPITHET	RCT	0	−1	0	0	0	−1	0	0	0	−1	−1	−1	0	−1	−1	49	7	14.3	52	13	25	RR	1.75	0.76 − 4.02
ECASS II	RCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	391	42	10.7	409	43	10.5	RR	0.979	0.65 − 1.46

コメント（該当するセルに記入）

IST-3												80 歳以上が 4 分の 1 位	用量が日本より多い												
EPITHET			4 名のブロックランダム化				脱落例あり					80 歳以上が多い	用量が日本より多い		90 日時点で判定										
ECASS II				1-3 時間と 3-6 時間が混在だが差なし									用量が日本より多い		90 日時点で判定										